


CLASA a V-a

SOLUȚII ȘI BAREME

1. La un campionat de fotbal, Andrei, Mihai și Vasile au marcat împreună 22 de goluri. Andrei a marcat de trei ori mai multe goluri decât Vasile, iar Mihai jumătate din numărul golurilor marcate de Andrei. Câte goluri a marcat fiecare?



Dacă luăm o jumătate din segmentul care reprezintă numărul golurilor marcate de Vasile, 1p
 observăm că la Andrei sunt 6 astfel de "bucăți" iar la Mihai 3, în total 11 "bucăți" . . . 1p
 Deci "bucata" respectivă reprezintă $22:11 = 2$ (goluri). 1p
 Prin urmare Vasile a marcat 4 goluri, Andrei 12 și Mihai 6. 1p

1. Să se determine numerele naturale \overline{abc} , scrise în baza 10, astfel încât

$$\overline{abc} = \overline{cba} + \overline{ab} + \overline{ba} + \overline{ca} + \overline{ac} + \overline{bc} + \overline{cb}.$$

Relația dată conduce la $100a + 10b + c = 23a + 32b + 122c$

Adică $77a = 22b + 121c \Leftrightarrow 7a = 2b + 11c$

Pentru că $7a \leq 7 \cdot 9 = 63 \Rightarrow c \leq 5$

$c = 1$, duce la $7a = 2b + 11 = 2b + 4 + 7 = 2(b + 2) + 7$ de unde rezultă $(b + 2):7$,
 adică $b = 5$, $7a = 21$ și $a = 3$; avem 351 1p

$c = 2$, duce la $7a = 2b + 22 = 2b + 8 + 14 = 2(b + 4) + 14$, apoi $(b + 4):7$
 prin urmare $b = 3$ și $a = 4$; avem 432 1p

$c = 3$, duce la $7a = 2b + 33 = 2b + 5 + 28$, $(2b + 5):7$, $b = 1$ și $a = 5$
 $= 2b + 35 - 2 = 2(b - 1) + 35$, $(b - 1):7$, $b = 8$ și $a = 7$
 Se obțin numerele 513 și 783 1p

$c = 4$, $7a = 2b + 44 = 2(b + 1) + 42$, $b = 6$ și $a = 8$; avem 864 1p

$c = 5$, $7a = 2b + 55 = 2b + 6 + 49 = 2(b + 3) + 49$, cu $b = 4$ și $a = 9$; 945 soluție 1p

3. Există 5 numere naturale a, b, c, d și e cu proprietatea că suma a oricăror patru dintre ele dă restul 1 prin împărțirea la 4?

Presupunem că există astfel de numere, prin urmare am avea:

$$\left. \begin{aligned} a+b+c+d &= M_4 + 1 \\ a+b+c+e &= M_4 + 1 \\ a+b+d+e &= M_4 + 1 \\ a+c+d+e &= M_4 + 1 \\ b+c+d+e &= M_4 + 1 \end{aligned} \right\} 5p$$

Dacă adunăm membru cu membru obținem $4(a + b + c + d + e) = M_4 + 5 = M_4 + 1$ 1p

Ceea ce este imposibil, prin urmare nu există astfel de numere. 1p

CLASA a VI-a

SOLUȚII ȘI BAREME

- 1. Determinați toate numerele naturale nenule care împărțite la 17 dau câtul egal cu restul și împărțite la 23 dau , de asemenea , câtul egal cu restul.**

Fie $n \in \mathbb{N}^*$ așa încât $n = 17 \cdot q + q$, $q < 17$, $q \in \mathbb{N}$	1 p
$n = 23 \cdot r + r$, $r < 23$, $r \in \mathbb{N}$	1 p
de unde $n = 18q$ cu $0 \leq q < 17$	0,5 p
$n = 24r$ cu $0 \leq r < 23$	0,5 p
Din $18q = 24r$ rezultă $3q = 4r$	1,5 p
Deci $q = 4a$, $r = 3a$ cu $a \in \mathbb{N}$ și $a \leq 4$	1 p
Rezultă $n = 18 \cdot 4a = 72a$, $a = 0, 1, 2, 3, 4$	1 p
Deci $n \in \{0, 72, 144, 216, 288\}$	0,5 p.

- 2. Determinați m, n numere naturale astfel încât $2^m - 2^n = 120$.**

Deoarece $2^m > 2^n$ rezultă $m > n$. Fie $p = m - n \in \mathbb{N}$	2 p
Atunci $2^{n+p} - 2^n = 120 \Leftrightarrow 2^n (2^p - 1) = 2^3 \cdot 15$	2 p
Pt. că $2^p - 1$ este impar, este necesar ca	
$\begin{cases} 2^n = 2^3 \\ 2^p - 1 = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n = 3 \\ 2^p = 16 = 2^4 \end{cases} \Leftrightarrow n = 3 \text{ și } p = 4$	2 p
Deci $m = n + p = 3 + 4 = 7$	1 p

- 3. Arătați că numărul $x = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2009 \cdot 2010 \cdot \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2009} + \frac{1}{2010}\right)$**

este natural și se divide cu 2011.

$$x = 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2010 + 1 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2010 + 1 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2010 + \dots + 1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 2008 \cdot 2009 + 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2009 \in \mathbb{N} \quad 2p$$

Apoi:

$$x = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2010 \left[\left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2010} \right) + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2009} \right) + \dots + \left(\frac{1}{1005} + \frac{1}{1006} \right) \right] \quad 2p$$

$$= 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2010 \left[\frac{2011}{1 \cdot 2010} + \frac{2011}{2 \cdot 2009} + \dots + \frac{2011}{1005 \cdot 1006} \right] = \quad 1p$$


$$= 2011 [2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2009 + 1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 2008 \cdot 2010 + \dots + 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 1004 \cdot 1007 \cdot \dots \cdot 2010] = \quad 1p$$

$$= 2011 \cdot a, \quad a \in \mathbb{N} \text{ de unde avem că } 2011 \text{ îl divide pe } x. \quad 1p$$

CLASA a VII-a

SOLUȚII ȘI BAREME

1. În triunghiul ABC , M este mijlocul înălțimii AD ($D \in (BC)$), iar $E \in (AC)$ astfel încât $EC = 2AE$. Arătați că punctele B, M, E sunt coliniare dacă și numai dacă $[AB] \equiv [AC]$.



Considerăm B, M și E sunt coliniare și construim $DT \parallel BE$ 1p

Atunci în $\triangle ADT$, ME este linie mijl. și $ET = AE = \frac{1}{2}EC$ 0,5p

De unde avem că T e mijlocul lui EC , adică DT linie mijlocie în $\triangle BCE$ și atunci D e mijlocul lui BC . 1p

Cum AD e înălțime și mediană, avem triunghi isoscel, adică $[AB] \equiv [AC]$. 1p

Reciproc; presupunem că $[AB] \equiv [AC]$, adică triunghiul $\triangle ABC$ este isoscel. Cum AD este înălțime va fi și mediană, adică D este mijlocul lui BC . 1,5p

Construim $DT \parallel BE \Rightarrow DT$ linie mijlocie în $\triangle BEC$, T fiind mijlocul lui $EC \Rightarrow TE = AE$ 1p

Deci în $\triangle ADT$, ME este linie mijlocie și atunci $DT \parallel ME$. Dar prin E avem o singură paralelă la DT .

Prin urmare B, M și E coliniare. 1p

2. Să se determine $a, b \in \mathbb{N}$ știind că 1997 împărțit la a dă restul $2b - a$ și împărțit la b dă restul $2a - 10$.

Resturile sunt numere naturale sunt numere naturale, deci $2a - 10 \geq 0$, $2b - 9 \geq 0$ de unde avem că $a \geq 5$ și $b \geq 5$. 1p

Cum restul e mai mic decât împărțitorul, $2b - 9 < a$ iar $2a - 10 < b$ 1p

Atunci $b > 2a - 10 > 2(2b - 9) - 10 \Rightarrow b > 4b - 28 \Rightarrow 3b < 28$ adică $b \in \{5, 6, 7, 8, 9\}$ 1p

În plus, b nu poate fi par (restul împ. lui 1997 la b este $2a - 10$ care este par) deci $b \in \{5, 7, 9\}$ 1p

Dacă $b = 5$, avem $1997 = 5 \cdot 399 + 2$, adică $a = 6$ și cum $1997 = 6 \cdot 332 + 5$, $2b - 9 = 5$ adică $b = 7 \neq 5$.

Valoarea nu convine 1p

Dacă $b = 7$, avem $1997 = 7 \cdot 285 + 2$, adică $a = 6$, din nou $1997 = 6 \cdot 332 + 5$, $2b - 9 = 5$ adică $b = 7$,

deci $a = 6$ și $b = 7$ 1p

Dacă $b = 9$, avem $1997 = 9 \cdot 221 + 8$, adică $a = 9$. Avem $1997 = 9 \cdot 221 + 8$ adică $2b - 9 = 8$, imposibil.

În concluzie $a = 6$ și $b = 7$. 1p

3. Dacă x, y, z, t sunt numere reale, atunci

$$(-x + y + z + t)^2 + (x - y + z + t)^2 + (x + y - z + t)^2 + (x + y + z - t)^2 + \frac{1}{4} \geq x + y + z + t$$

Precizați cazul de egalitate.


După ridicările la pătrat, se obține inegalitatea $4(x^2 + y^2 + z^2 + t^2) - x - y - z - t + \frac{1}{4} \geq 0$ 2p

care este echivalentă cu $\left(2x - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(2y - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(2z - \frac{1}{4}\right)^2 + \left(2t - \frac{1}{4}\right)^2 \geq 0$ ineg evidentă 4p

Pentru $x = y = z = t = \frac{1}{8}$ se realizează egalitatea 1p

CLASA a VIII-a
SOLUȚII ȘI BAREME

1. Fie patrulaterul inscriptibil $ABCD$. Dacă $AC \cap BD = \{O\}$, $E \in (OC)$ și $F \in (BD)$, să se demonstreze că $EF \parallel AB$ dacă și numai dacă $\angle ADE \equiv \angle BCF$.



Presupunem că $EF \parallel AB$, atunci $\widehat{DEF} \equiv \widehat{BAO}$ (1) 1p
 $ABCD$ inscriptibil $\Rightarrow \widehat{BAO} \equiv \widehat{BDC}$ (2) 0,5p
 Din (1) și (2) rezultă $\widehat{BDC} \equiv \widehat{OEF}$ ceea ce conduce la faptul că patrulaterul $DCEF$ este inscriptibil, deci $\widehat{EDF} \equiv \widehat{ECF}$ (3) 1,5p
 Cum $\widehat{BCA} \equiv \widehat{BDA}$, împreună cu (3) dă $\widehat{ADE} \equiv \widehat{BCF}$ 0,5p
 Reciproc. Avem $\widehat{ADE} \equiv \widehat{BCF}$ (4), cum $\widehat{BCA} \equiv \widehat{BDA}$ (5) 0,5p
 se ajunge la $\widehat{ECF} \equiv \widehat{EDF}$ și rezultă că $CDEF$ este inscriptibil
 Prin urmare $\widehat{CDB} \equiv \widehat{OEF}$ 2p
 Din $\widehat{BDC} \equiv \widehat{BAC} \Rightarrow \widehat{OEF} \equiv \widehat{BAD}$ și așa rezultă $EF \parallel AB$ 1p

2. Demonstrați că pentru orice n număr natural are loc inegalitatea

$$\sqrt{n + \sqrt{n + \dots + \sqrt{n + \sqrt{n}}}} < \frac{1 + \sqrt{1 + 4n}}{2}.$$

Ridicăm la pătrat fiecare membru al inegalității: 1p

$$n + \sqrt{n + \sqrt{n + \dots + \sqrt{n}}} < \frac{1 + 2\sqrt{1 + 4n} + 1 + 4n}{4}$$

$$n + \sqrt{n + \dots + \sqrt{n + \sqrt{n}}} < \frac{1 + 2n + \sqrt{1 + 4n}}{2}, \text{ sau } \sqrt{n + \dots + \sqrt{n + \sqrt{n}}} < \frac{1 + \sqrt{1 + 4n}}{2} \quad 3p$$

Obs că membrul drept rămâne același. Ridicăm succesiv la pătrat și ajungem la 1p

$$\sqrt{n} < \frac{1 + \sqrt{1 + 4n}}{2} \Leftrightarrow 0 < \frac{1 + \sqrt{1 + 4n}}{2}, \text{ inegalitate evidentă. Prin urmare relația este adevărată. } 2p$$

3. Fie a și n două numere naturale nenule. Arătați că numărul

$$x_n(a) = 1 + a + a^2 + a^3 + \dots + a^{12n-1} \text{ se divide prin } (a+1)(a^2+1)(a^8+a^4+1).$$

Grupăm câte patru termeni : 1p

$$\begin{aligned} x_n(a) &= (1 + a + a^2 + a^3) + a^4(1 + a + a^2 + a^3) + \dots + a^{12n-4}(1 + a + a^2 + a^3) = \\ &= (a+1)(a^2+1)(1 + a^4 + a^8 + \dots + a^{12n-4}) = (a+1)(a^2+1)y_n(a) \end{aligned} \quad 2p$$

În $y_n(a)$ grupăm câte 3 termeni și avem: 1p

$$y_n(a) = 1 + a^4 + a^8 + a^{12}(1 + a^4 + a^8) + \dots + a^{12n-12}(1 + a^4 + a^8) = 1p$$

$$= (1 + a^4 + a^8)(1 + a^{12} + \dots + a^{12n-12}) = (1 + a^4 + a^8)z_n(a) \quad 1p$$

Deci $x_n(a) = (a+1)(a^2+1)(a^8+a^4+1)z_n(a)$ ceea ce arată că

$$x_n(a) \text{ este divizibil cu } (a+1)(a^2+1)(a^8+a^4+1). \quad 1p$$